⚠ 孕产妇紧急危险体征近一年内有妊娠或分娩行为?

如果您出现以下任何紧急危险体征, 请拨打 9-1-1
或前往距您最近的急诊室/产科急诊分诊处!

头痛久治不愈或随着时间推移而加重, 伴有或不伴有视力变化

呼吸困难

胎动停止或减少

癫痫

妊娠期阴道出血或渗液



剧烈腹痛, 久治不愈



出现伤害自己或宝宝的念头

到达急诊室/产科急诊分诊处后, 请告知医护人员以下信息:

- 您的姓名
- 您已怀孕, 或您于(日期)进行了剖宫产或阴道分娩
- 您的产科医生姓名以及您的分娩地点
- 您目前出现的危险体征

如果您出现以下任何孕产妇紧急危险体征, 请致电您的产科医生, 告知其您需要*立即就诊*:

发烧

手部或面部极度肿胀

下肢疼痛、肿胀或发红

胸痛或心动过速

严重恶心与呕吐(区别于孕吐)

眩晕或昏厥

极度疲惫

视力变化

产后阴道大量出血(出血量多于月经量)

到达诊室或您的产科医生处后, 请告知其以下信息:

- 您的姓名
- 您已怀孕, 或您于(日期)进行了剖宫产或阴道分娩
- 您目前出现的危险体征, 以及导致您需要*立即*就诊/联系医生的危险体征。

如果无法联系到您的产科医生, 请前往急诊室/产科急诊分诊处!

AIM ALLIANCE FOR INNOVATION ON MATERNAL HEALTH

Dartmouth Health

NEW HAMPSHIRE DHHS Department of HEALTH & HUMAN SERVICES

ERASE MM

NH PQC

本《孕产妇紧急警告信号》宣传页中所含内容仅供参考/教育之用, 无意作为完整无遗之陈述, 亦不适用于任何特定个体之医疗状况。本宣传页内容不可替代专业医疗建议、诊断或治疗。如果您对自身健康状况有任何疑问, 请咨询医疗服务提供者。

扫描我!